

کاربرد مدل تلفیقی AR-ARCH در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

مرضیه عباس‌زاده افشار^۱، کیوان خلیلی^{*۲}، جواد بهمنش^۳

تاریخ دریافت: ۹۳/۰۳/۱۸ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۴/۰۱

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

^۲استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

^۳دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: k.khalili@urmia.ac.ir

چکیده

استفاده از مدل‌های سری زمانی یکی از راههای کاربردی در شبیه‌سازی و پیش‌بینی داده‌های هیدرولوژیک است. یکی از مشکلات عمده در استفاده از مدل‌های سری زمانی، نحوه تولید داده‌های تصادفی است به‌طوری‌که در این فرآیند داده‌های تولیدی با تغییر سری تصادفی، تغییر خواهد کرد. در این تحقیق بعد از بررسی اولیه داده‌های سالانه تراز سطح آب دریاچه ارومیه، این داده‌ها با مدل‌های خطی سری زمانی موردنبررسی قرار گرفتند و مدل ARMA(3,0) از بین مدل‌های خانواده ARMA به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید. سپس سری زمانی باقی‌مانده مدل ARMA(3,0) با استفاده از مدل‌های غیرخطی AR(1) برازش داده شد و مدل تلفیقی AR-ARCH به دست آمد. نتایج دو آزمون ضریب تبیین (R^2) و بررسی خطأ (RMSE) نشان از دقت بالاتر مدل تلفیقی نسبت به مدل ARMA(3,0) بود. با ترکیب دو مدل مذکور، دقت صحت سنجدی (ضریب تبیین) و میزان خطای مدل (جزر میانگین مربعات خطأ) به ترتیب ۸/۸ درصد و ۲۲ درصد بهبود یافت. نتایج پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه نشان از وجود یک فرصت اقلیمی جدید جهت احیای دریاچه ارومیه خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: خودهمبسته، سری زمانی، مدل‌های خطی، مدل‌های غیرخطی، واریانس شرطی

Application of Combined AR-ARCH model in Forecasting Urmia Lake Water Level

M Abbaszadeh Afshar¹, K Khalili^{2*}, J Behmanesh³

Received: 8 June 2014

Accepted: 22 June 2015

¹- M.Sc. Student, Dept. of Water Eng. Faculty of Agriculture. Urmia Univ. Urmia, Iran

²- Assist. Prof., Dept. of Water Eng. Faculty of Agriculture. Urmia Univ. Urmia, Iran

³- Assoc. Prof., Dept. of Water Eng. Faculty of Agriculture. Urmia Univ. Urmia, Iran

* Corresponding Author, Email: k.khalili@urmia.ac.ir

Abstract

One of the applicable methods for simulating and forecasting hydrological data is time series modeling approach. One of the main problems with applying time series modeling is generating stochastic series, since the generated data will be changed with changing the random series. In this research, after initial investigations on annual water level data of the Urmia lake, linear time series models were fitted to the data and the ARMA (3,0) model was selected as the best model among the ARMA series. Then, the time series residual of ARMA (3) model were fitted using non-linear ARCH (1) models, and a combined AR-ARCH model was obtained. The results showed that the combined model had more accuracy than ARMA (3,0) model. With combining the two mentioned models, values of the model validation accuracy (R^2 coefficient) and error of model (Root mean square error) were improved 8.8% and 33%, respectively. Predicting results of Urmia lake water level showed that a climatic opportunity would be existed in the direction of Urmia Lake restoration.

Keywords: Autoregressive, Conditional variance, Linear models, Nonlinear models, Time series

واریانس شرطی (ARCH⁽¹⁾) بر این فرض استوارند که واریانس خطاهای در یک مدل تابعی از اندازه خطاهای در دوره‌های زمانی قبل است (انگل ۱۹۸۲). مدل‌های ARCH اولین بار برای سری‌های زمانی مالی بکار برده شدند. در واقع این مدل دسته‌بندی‌های نوسانی بر پایه زمان که دوره‌های دارای نوسان با دوره‌های بدون نوسان همراه می‌شوند را نشان می‌دهد. انگل (۱۹۸۲) با مطالعه مدل‌های خودهمبسته با واریانس شرطی

مقدمه

بسیاری از فرآیندهای مربوط به سیستم‌های طبیعی نسبت به زمان غیرخطی بوده اگرچه جنبه‌های خاصی از این سیستم‌ها ممکن است نسبت به جنبه‌های دیگر به فرآیند خطی نزدیکتر باشند. به‌حال ماهیت غیرخطی بودن برای ما کاملاً آشکار نیست (تسوئیس ۲۰۰۱). بهمین دلیل به‌نظر می‌رسد با ترکیب مدل‌های خطی و غیرخطی، نتایج مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی را افزایش داد. در اقتصاد سنجی، مدل‌های خودهمبسته با

را انجام دادند. آن‌ها با تمرکز روی جفت مثبت مشاهده و مدل‌سازی بارش، این مدل را برای پایش محلی در جهت اصلاح داده‌ها به کار گرفتند. خطیبی و همکاران (۲۰۱۴) مدل‌های سری زمانی، برنامه‌ریزی ژنتیک و شبکه عصبی را جهت پیش‌بینی تراز سطح آب ^۶ دریاچه با خصوصیات فیزیولوژیکی متفاوت را مورد بررسی قرار دادند. مدل غیرخطی دوخطی در شاخه‌های مختلف علوم نظری اقتصاد به کار گرفته شده است ولی به نظر می‌رسد در منابع آب و تحقیقات مربوط به آن کمتر به کار برده شده است. قدموپور و همکاران (۱۳۹۰) مدل‌های کلاسیک سری زمانی و هوش مصنوعی را برای تعیین تراز آب زیرزمینی در منطقه آنیون کانتی^۴ در ایالت نیوجرسی آمریکا استفاده کردند و نتایج حاکی از آن بود که در روش آنالیز سری زمانی با استفاده از مشاهدات و از بین مدل‌های کلاسیک، مدل ARMA مدل مناسب جهت برآشش بر مبنای پیش‌بینی‌ها با سطح اعتماد ۹۵٪ است. شفاقیان و همکاران (۱۳۹۰) مدل‌سازی زمانی (پیش‌بینی) تراز آب زیرزمینی با استفاده از منطق فازی و روش‌های پایه تحلیل سری‌های زمانی در دشت شیراز مورد مقایسه قرار دادند و نتایج حاکی از آن بود که با توجه به مقدار اعتبار روش‌ها، (که با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل و خطای جذر میانگین مربعات^۵ (RMSE) برای دو روش به دست آمد) روش ARMA از دقت بیشتری برخوردار است. اما دقت کلی روش‌ها به موقعیت ایستگاه‌های مختلف و تغییرات تراز آب زیرزمینی بستگی دارد. خلیلی و همکاران (۱۳۹۱) با استفاده از الگوهای ترکیبی-^{BL} ARCH دبی روزانه رودخانه شهرچای ارومیه را به مدت ۱۱ سال پیش‌بینی و مدل‌سازی کردند. هدف از این مطالعه بررسی مدل‌های خانواده ARCH جهت مدل‌سازی بخش تصادفی مدل‌های خانواده ARMA و تلفیق این دو مدل در راستای مدل‌سازی و پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه است.

(ARCH)، موفق به توسعه روش‌های جدید و بهتر برای مدل‌سازی و پیش‌بینی متغیر تصادفی متناسب با زمان و نوسانات بازارهای مالی شد. بعد از انگل (۱۹۸۲) مطالعات زیادی در مورد مدل‌های ARCH انجام گردید. بولرسليو و همکاران (۱۹۹۲) مدل‌های واریانس شرطی را برای داده‌های مالی بکار برند. بیرا و هایگینس (۱۹۹۳) مدل‌های ARCH را به عنوان یک عامل موثر در مدل‌های خودهمبسته مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها دقت مدل فوق را در مدل‌سازی داده‌های مالی تأیید کردند. تحقیقات دیگری نیز در زمینه استفاده از مدل‌های ARCH صورت گرفته است که می‌توان به تحقیقات بولرسليو و همکاران (۱۹۹۴)، دایبولد و لوپز (۱۹۹۵)، پگن (۱۹۹۶)، پالم (۱۹۹۶)، شفارد (۱۹۹۶)، اندرسون و بولرسليو (۱۹۹۸)، انگل و پتون (۲۰۰۱) و انگل (۱۹۹۵) اشاره کرد. دگیاناكیز و زیکالاکی (۲۰۰۴) به منظور پیش‌بینی نوسانات بازار ارز از مدل‌های واریانس شرطی استفاده کردند. نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که ارائه مدل‌های سیستماتیک خودهمبسته با واریانس شرطی در سری‌های مالی بسیار مفید است. وانگ و همکاران (۲۰۰۵) از ترکیب مدل^۲ ARMA و مدل GARCH^۳ برای برآشش واریانس و میانگین روزانه جریان رودخانه زرد در چین استفاده کردند. نتایج Mطالعه ایشان نشان داد که مدل ARMA-GARCH نتایج سودمندی در مدل‌سازی سری روزانه جریان رودخانه ارائه می‌کند. کایادو (۲۰۰۷) عملکرد مدل‌های یک پارامتری سری‌های زمانی را در پیش‌بینی میزان آب و مصرفی اسپانیا با استفاده از مدل‌های ARMA و GARCH در مقیاس‌های روزانه و هفتگی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار داد. در نهایت ایشان جهت بهبود نتایج پیش‌بینی، استفاده از مدل‌های تلفیقی را پیشنهاد کرد. لائوکس و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از مدل غیرخطی سری زمانی ARMA-GARCH با ارزیابی بر روی داده‌های ایستگاه‌های منتخب در منطقه آلب آلمان، شبیه‌سازی بارش به عنوان پارامتر تصادفی

والد- ولفوویتس (ران- تست) برای بررسی استقلال و از روش ویلکاکسون برای بررسی همگنی داده‌های مورد مطالعه استفاده شد (ولکاکسون، ۱۹۴۵، مندلhal و رینمود، ۱۹۸۲، ناظری تهرودی و خلیلی ۱۳۹۲، کندال ۱۹۲۸ و من ۱۹۴۵).

مدل‌های ARMA


از اوایل دهه ۶۰ میلادی، مدل‌های سری زمانی خودهمبسته در پیش‌بینی داده‌های هیدرولوژی به طور وسیعی به کار گرفته شده‌اند. دلیل اصلی استفاده گسترده از این مدل‌ها، توانایی آن‌ها در ایجاد همبستگی بین داده‌های زمان حالت با زمان‌های پیشین از یک طرف و سادگی ساختار مدل از طرف دیگر هست. تماس و فیرینگ (۱۹۶۲) مدل‌های مذکور را برای اولین بار به کار برداشت و در دهه ۷۰ باکس و جنکیز (۱۹۷۶) این مدل‌ها را توسعه دادند. اساس این مدل‌ها بر پایه زنجیره مارکف^۷ است که مقادیر متغیرهای سری زمانی در زمان t با مقادیر آن در زمان قبل ($t-1$) و بعد ($t+1$) وابسته هستند. از دیگر مدل‌های سری زمانی می‌توان به مدل‌های خود همبسته با میانگین متحرک (ARMA) و آریما (ARIMA)^۸ اشاره نمود (ناظری تهرودی و همکاران ۱۳۹۲). با در نظر گرفتن سری زمانی نرمال و استاندارد Z_t مدل میانگین متحرک خودهمبسته به شرح زیر در نظر گرفته شد:

$$Z_t = \sum_{i=1}^p (\varphi_i Z_{t-i}) - \sum_{j=1}^q (\theta_j \varepsilon_{t-j}) + \varepsilon_t \quad [1]$$

که در آن p مرتبه مدل q مرتبه مدل ARMA و φ_i ضرایب مدل و θ_j سری تصادفی و نرمال مدل با میانگین صفر و واریانس σ_ε^2 هست (سالاس ۱۹۹۳). اساس تخمین پارامترهای مدل‌های خودهمبسته، ضرایب خودهمبستگی یک سری زمانی هست (خلیلی و همکاران ۲۰۱۴). در یک سری زمانی، ضریب خودهمبستگی ρ_k با تأخیر k ، از رابطه زیر که به صورت یک عدد بین ۰ و ۱ است بدست می‌آید (کارآموز و عراقی نژاد ۱۳۸۴):

مواد و روش‌ها منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، دریاچه ارومیه است. حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین حوضه‌های منطقه‌ای ایران است که در بخش شمال غرب ایران واقع شده است. این حوضه با وسعتی برابر ۵۲۷۰۰ کیلومترمربع و مساحتی معادل ۳/۲۱ درصد مساحت کل کشور، بین مدار ۳۵ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۲۹ دقیقه عرض شمالی و نصف‌النهار ۴۴ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. در این مطالعه از داده‌های سری زمانی تراز سطح آب اندازه‌گیری شده در دوره آماری ۱۳۵۲-۱۳۹۱ استفاده شد. متوسط تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری مذکور ۱۲۷۵/۱۰ متر هست. شکل ۱ موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می‌دهد.



شکل ۱- موقعیت دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران.

جهت بررسی روند داده‌های سری زمانی تراز سطح آب دریاچه ارومیه از روش من- کندال و جهت از بین بردن روند موجود در داده‌ها از روش تفاضل- گیری استفاده شد. در این روش داده‌ها به ترتیب نزولی مرتب و هر داده از داده ماقبل خود کسر می‌شود. بدین ترتیب روند داده‌های سری زمانی از بین خواهد رفت. جهت مدل‌سازی می‌باشد آزمون استقلال و همگنی داده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از روش

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (P_i - O_i)^2}{\sum (O_i - \bar{O}_i)^2} \quad [7]$$

ضریب تبیین ^{۱۰}

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |O_i - \bar{O}_i| \quad [8]$$

میانگین قدر مطلق خطای

که در آنها O_i : داده‌های واقعی یا مشاهده‌ای و P_i : داده‌های پیش‌بینی و \bar{O}_i میانگین داده‌های مشاهداتی هستند (صفوی ۱۳۸۸).

ARCH مدل‌های

اولین مدلی است که یک چارچوب نظاممند را برای مدل‌سازی نوسانات فراهم می‌کند که این مدل توسط انگل (۱۹۸۲) معرفی گردید. ایده اصلی مدل‌های ARCH به دو صورت است که (الف) میانگین اصلاح شده داده‌های مورداستفاده مجزا اما وابسته است و (ب) مدل وابسته است و می‌تواند توسط یک تابع ساده درجه دوم از مقادیر قبل از آن شرح داده شود. به طور خلاصه، مدل ARCH به صورت زیر فرض می‌شود:

$$\varepsilon_t = \sigma_t Z_t \quad \text{and} \quad \sigma_t^2 = a_0 + \sum_{i=1}^m b_i \varepsilon_{t-i}^2 \quad [9]$$

که در آن σ_t^2 واریانس شرطی، ε_t عبارت خطای یا باقیمانده مدل با میانگین صفر و واریانس یک، $a_0 \geq 0, b_i \geq 0$ پارامترهای مدل، m همان مرتبه مدل و Z_t سری زمانی پارامتر موردنظر است (انگل ۱۹۸۲).

ساختار مدل ARCH

برای درک بهتر مدل، ساختار مدل (۱) در نظر گرفته شد.

$$\varepsilon_t = \sigma_t a_t \quad \text{و} \quad \sigma_t^2 = a_0 + b_1 \varepsilon_{t-1}^2 \quad [10]$$

که در آن $a_0 \geq 0, b_1 \geq 0$ است. در ابتدا میانگین شرطی a_t را باید صفر در نظر گرفت. زیرا: $E(a_t) = E[E(a_t | F_{t-1})] = E[\sigma_t E(\varepsilon_t)]$ سپس واریانس شرطی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$p_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X}_t)(X_{t+k} - \bar{X}_{t+k})}{[\sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X}_t)^2 (\sum_{t=1}^{n-k} (X_{t+k} - \bar{X}_{t+k})^2)^{0.5}]^{0.5}} \quad [2]$$

$K = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

که در آن X_t داده‌های مشاهداتی، \bar{X}_t میانگین داده‌های مشاهداتی، X_{t+k} داده مشاهداتی با تأخیر $t+k$ و \bar{X}_{t+k} نیز میانگین داده‌های با تأخیر $t+k$ است.

$$\varphi_k(K) = \frac{P_k - \sum_{j=1}^{k-1} \varphi_j(K-1) \cdot P_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \varphi_j(K-1) \cdot P_j} \quad [3]$$

$j = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, K$

که در آن P_k ضریب خودهمبستگی با تأخیر k است. مدل برتر با استفاده از معیار آکاییکه کمتر از بین مدل‌های خانواده ARMA انتخاب می‌گردد. آماره معیار آکاییکه اصلاح شده (AICC) به شرح زیر محاسبه می‌شود (سالاس ۱۹۹۲).

$$AICC(p, q) = n \ln(\hat{\sigma}_\varepsilon^2) + \frac{2(p+q+1)n}{(n-p-q-2)} \quad [4]$$

که در آن n تعداد داده‌ها، p مرتبه مدل در بخش میانگین متحرک و $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$ واریانس خطایها هست که از رابطه زیر به دست آمد:

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{s^2 (1 - \varphi_1^2)}{(1 - 2\varphi_1\theta_1 + \theta_1^2)} \quad [5]$$

ارزیابی مدل‌ها

به منظور ارزیابی عملکرد مدل‌های موردناستفاده از ضریب همبستگی و معیارهای بررسی خطای میانگین مربعات خطای و میانگین قدرمطلق خطای^{۱۰} و ضریب تبیین به شرح زیر استفاده گردید. روشی که کمترین مقدار جذر میانگین مربعات خطای و میانگین قدرمطلق خطای و یا بیشترین مقدار ضریب تبیین را داشته باشد از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود (استیل و توری ۱۹۶۰).

-۱ جذر میانگین مربعات خطای

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (O_i - P_i)^2}{n}} \quad [6]$$

$$m_4 = \frac{3\alpha_0^2(1+\alpha_1)}{(1-\alpha_1)(1-3\alpha_1^2)} \quad [18]$$

جهت برازش و تلفیق دو مدل ARMA و ARCH، ابتدا داده‌های مورد نظر با استفاده از مدل‌های خانواده ARMA برازش داده خواهد شد. با استفاده از پارامترهای مدل ARMA و رابطه کلی مدل‌های این خانواده، سری زمانی باقیمانده مدل با استفاده از رابطه زیر استخراج می‌گردد:

$$\varepsilon_t = Z_t - \left[\sum_{i=1}^p (\varphi_i Z_{t-i}) - \sum_{j=1}^q (\theta_j \varepsilon_{t-j}) \right] \quad [19]$$

سری زمانی حاصل شده، با استفاده از مدل‌های غیرخطی برازش داده می‌شود و با استفاده از مدل مذکور، سری باقیمانده مدل تولید می‌شود. سپس با بهکارگیری رابطه ۱۲ و پارامترهای مدل ARCH، سری جدید باقیمانده مدل حاصل خواهد شد. درنهایت با ترکیب دو مدل ARMA(3,0) و ARCH(1)، مدل ترکیبی AR-ARCH چهت مدل‌سازی و پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه حاصل می‌گردد. جهت انجام محاسبات از نرم‌افزار SAMS2007 و محیط Excel استفاده شد.

نتایج و بحث

سری زمانی ۴۰ ساله تراز سطح آب دریاچه ارومیه در مقیاس سالانه با استفاده از آزمون‌های اولیه موردنرسی قرار گرفتند و نتایج بررسی اولیه داده‌ها نشان از وجود روند در داده‌های سری زمانی و هم‌چنین نشان‌دهنده عدم همگنی و تصادفی بودن داده‌ها بود. نتایج بررسی اولیه داده‌ها در سطح اطمینان ۵ درصد معنی‌دار بود. نمودار سری زمانی اولیه و نتایج اولیه داده‌ها به شرح شکل ۲ هست.

$$Var(a_t) = E(a_t^2) = E[E(a_t^2 | F_{t-1})] \quad [12]$$

از آنجاکه a_t با توجه به $E(a_t) = 0$ ثابت است، بنابراین خواهیم داشت:

$$Var(a_t) = \alpha_0 + \alpha_1 Var(\alpha_t) \quad [13]$$

$$Var(a_t) = \frac{\alpha_0}{(1 - (\alpha_0))} \quad [14]$$

از آنجاکه واریانس a_t باید مثبت باشد، در نتیجه محدوده α_1 باید بین ۰ و ۱ باشد. در برخی از برنامه‌های کاربردی، مقادیر بالاتر از (a_t) نیز باید وجود داشته باشد و از این‌رو، α_1 باید برخی از گشتاورهای اضافی را تأمین کند. به عنوان مثال، در مطالعه رفتار دنباله‌ها، نیاز است که گشتاور چهارم (a_t) نیز محدود شود. با فرض نرمال بودن ε_t در معادله زیر خواهیم داشت:

$$E(a_t^4 | F_{t-1}) = 3[E(a_t^2 | F_{t-1})]^2 \\ = 3(\alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2)^2 \quad [15]$$


بنابراین:

$$E(a_t^4) = E[E(a_t^4 | F_{t-1})] \\ = 3E(\alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2)^2 \\ = 3E(\alpha_0^2 + 2\alpha_0\alpha_1 a_{t-1}^2 + \alpha_1^2 a_{t-1}^4) \quad [16]$$

اگر α_1 به عنوان ثابت چهارم در نظر گرفته شود و $m_4 = E(a_t^4)$ در این صورت:

$$m_4 = 3E(\alpha_0^2 + 2\alpha_0\alpha_1 Var(a_t) + \alpha_1^2 m_4) \\ = 3\alpha_0^2 \left(1 + 2 \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_1}\right) + 3\alpha_1^2 m_4 \quad [17]$$

در نهایت:



شکل ۲ - نمودار داده‌های اولیه متوسط سالانه تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری.

آکاییکه کمتر انتخاب شد و مدل ARMA(3,0) یا مدل AR(3) از بین مدل‌های خانواده ARMA به عنوان مدل برتر معرفی شد. پارامترهای مدل‌های موردنبررسی به شرح جدول ۲ ارائه گردید.

با استفاده از رابطه حاصل شده توسط پارامترهای مدل ARMA، سری باقی‌مانده مدل، استخراج گردید:

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &= Z_t - ((-0.639947' Z_{t-1}) \\ &\quad +(0.606788' Z_{t-2}) \\ &\quad +(0.282381' Z_{t-3})) \end{aligned} \quad [19]$$

بعد از استخراج سری باقی‌مانده مدل، سری زمانی مذکور با استفاده از مدل‌های ARCH برآش داده شد و رابطه زیر جهت محاسبه واریانس شرطی حاصل شد:

$$\sigma_t^2 = 0.4017 + 5.18 * 10^{-8} \varepsilon_{t-1}^2 \quad [20]$$

جهت بررسی و صحبت‌سنجی مدل‌های موردناستفاده، از داده‌های واقعی ۵ سال انتهای دوره آماری استفاده شد. در این روش ابتدا ۵ سال داده انتهای دوره آماری (۱۳۹۱-۱۳۸۶) از سری زمانی ۴۰ ساله تراز سطح آب دریاچه ارومیه حذف گردید. سپس با استفاده از مدل‌های موردنبررسی و با ورود ۲۵ سال داده مشاهداتی به مدل‌ها، تراز سطح آب دریاچه ارومیه به مدت ۵ سال (۱۳۸۶-۱۳۹۱) پیش‌بینی گردید. در نهایت

جهت افزایش دقت مدل‌سازی با استفاده از مدل‌های خطی سری زمانی خانواده ARMA، داده‌های موردناستفاده باید بدون روند باشند. به همین دلیل روند داده‌های موردنبررسی با استفاده از روش تقاضل‌گیری حذف گردید. با حذف روند سری‌های زمانی، تغییرات داده‌ها نسبت به زمان ثابت در نظر گرفته می‌شود و این موضوع در مدل‌های خانواده آرما باعث افزایش دقت مدل‌سازی می‌شود. بعد از حذف روند، همگنی و استقلال داده‌های بدون روند تراز سطح آب دریاچه موردن تأیید واقع شد. نتایج بررسی آزمون‌های مذکور به شرح جدول ۱ ارائه گردید.

جدول ۱- نتایج اولیه بررسی سری زمانی بدون روند.

آزمون	p-value	نتیجه آزمون
تصادفی بودن داده‌ها	.۰۰۰۳	Wald-Wolfowitz
بدون روند	.۱۳۳	Mann - Kendall
همگن بودن داده‌ها	.۹۶۶	Wilcoxon


بعد از حذف روند داده‌های تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش تقاضل‌گیری و تأیید بررسی اولیه داده‌ها، نتایج نشان داد که داده‌های بدون روند با استفاده از تابع تبدیل $y = \ln(x+a)$ و با ضرایب $a = ۰.۱۶۷$ و $b = ۰.۱۴۵$ به ازای ضریب چولگی به شکل مناسبی نرمال می‌شوند. مدل برتر با توجه به معیار

درصد داده‌های مشاهداتی (۱۰ سال داده) نیز استفاده گردید. نتایج بررسی دقت مدل ARMA و مدل تلفیقی AR-ARCH در دو مقیاس ۵ و ۱۰ ساله به شرح شکل ۲ تا ۶ ارائه گردید.


داده‌های پیش‌بینی و مشاهداتی موربدبررسی و مقایسه قرار گرفت. همچنین جهت بررسی دقیق‌تر نتایج پیش‌بینی مدل‌های موربدبررسی، علاوه بر در نظر گرفتن ۵ سال داده جهت بررسی و صحت سنجی مدل‌ها، از ۲۵

جدول ۲- نتایج بررسی پارامترهای مدل ARMA


AICC	θ_3	θ_2	θ_1	Φ_3	Φ_2	Φ_1	مدل
۴۳				.۰/۲۸۲	.۰/۶۳۹	-.۰/۶۳۹	ARMA(3,0)
۴۴/۳۱						.۰/۷۵۶	ARMA(1,0)
۴۸/۰۹					.۰/۰۴۳	.۰/۸۱۹	ARMA(2,0)
۴۵/۴۳	-.۰/۲۶۱	-.۰/۲۲۲	.۰/۰۹۳		-.۰/۱۲۲	.۰/۸۸۶	ARMA(2,3)




شکل ۳- نتایج بررسی و صحت سنجی مدل تلفیقی AR-ARCH در دوره آماری ۱۳۸۶-۱۳۹۰.



شکل ۴- نتایج بررسی و صحت سنجی مدل (3)AR در دوره آماری ۱۳۸۶-۱۳۹۰.




شکل ۵- نتایج بررسی و صحت سنجی مدل (AR(3)) در دوره آماری ۱۳۸۱-۱۳۹۰.



شکل ۶- نتایج بررسی و صحت سنجی مدل تلفیقی AR-ARCH در دوره آماری ۱۳۸۱-۱۳۹۰.

سنجی داده‌ها نشان داد که دقت هر دو مدل قابل قبول بوده که خطوط اطمینان ۹۹ درصد نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در هر دو وضعیت ۵ و ۱۰ ساله، نتایج دو معیار MAE و RMSE حاصل از مدل تلفیقی کمتر از مدل AR(3) و همبستگی بین داده‌های مشاهده‌ای و داده‌های پیش‌بینی مدل تلفیقی بیشتر از مدل AR(3) بود.


نتایج آمارهای R^2 , MAE و RMSE ارائه شده در شکل‌های ۳ تا ۶ برای هر دو مدل بیان‌گر دقت قابل قبول مدل تلفیقی نسبت به مدل ARMA است. نتایج نشان داد که مدل تلفیقی در پیش‌بینی داده‌های حذف شده از همبستگی بالاتر و خطای کمتری برخوردار است. نتایج مدل‌سازی مدل تلفیقی به شرح شکل ۷ ارائه گردید. همچنین نتایج بررسی و صحت



شکل ۷- نتایج مدلسازی مدل AR-ARCH در مدلسازی تراز سطح آب دریاچه ارومیه.

بررسی نتایج مدلسازی و دقت مدل، با استفاده از مدل منتخب، تراز سطح آب دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۳ به صورت سالانه پیش‌بینی شد.

همان‌طور که از شکل ۷ مشاهده می‌شود، داده‌های مدلسازی شده تراز سطح آب دریاچه اختلاف زیادی با داده‌های مشاهداتی نداشتند و مدل به خوبی داده‌های مورد مطالعه را مدلسازی کرده است. بعد از



شکل ۸- پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۳ با استفاده از مدل تلفیقی AR-ARCH

اجرای این مدل‌ها، نتایج مدلسازی و پیش‌بینی‌ها تغییر می‌کند که این به این موضوع زیاد توجه نمی‌شود. جهت از بین بردن این ضعف می‌توان از مدل‌های غیرخطی

نتیجه‌گیری کلی یکی از ضعف‌های مدل‌های خانواده ARMA بخش تصادفی (باقي‌مانده) این مدل‌ها است که با هر بار

ضریب تبیین (R^2) و جذر میانگین مربعات خطای (RMSE) نشان از دقت بالاتر مدل تلفیقی نسبت به مدل AR(3) بود که خلیلی و همکاران (۱۳۹۱) نیز در تحقیق خود به برتری مدل‌های تلفیقی اشاره نمودند. نتایج پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه نشان از ایجاد یک فرصت اقلیمی جدید جهت احیای دریاچه ارومیه دارد. نتایج مدل‌ها نشان از ایجاد یک فرصت اقلیمی در جهت افزایش سطح آب دریاچه ارومیه دارد. همچنین نتایج ترکیب دو مدل نشان داد که ترکیب مدل‌های خطی و غیرخطی سری زمانی می‌تواند دقت مدل‌سازی را تا حدود زیادی افزایش دهد. با اضافه کردن مدل‌های غیرخطی به مدل‌های خطی سری زمانی می‌توان بخش تصادفی مدل‌های خطی را از بین برد و قطعیت مدل را افزایش داد. با ترکیب دو مدل مذکور، علاوه بر بالا بردن قطعیت مدل، می‌توان سری تصادفی متناسب با داده‌ها و از جنس داده‌ها تولید کرد که این کار باعث افزایش دقت و کاهش ریسک می‌شود.

سری زمانی مانند مدل‌های خانواده ARCH استفاده کرد. در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه تراز آب دریاچه ارومیه، سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌های تلفیقی مدل‌سازی و پیش‌بینی گردید. سری زمانی داده‌های تراز سطح آب دریاچه ارومیه، بعد از بررسی‌های اولیه با مدل‌های خانواده ARMA برازش داده شد و مدل (3) AR به ازای ARMA معیار آکاییکه کمتر از بین مدل‌های خانواده ARMA انتخاب شد. سپس با استفاده از روابط مدل‌های ARMA و مقدار پارامترهای این مدل، سری زمانی باقی‌مانده مدل استخراج گردید. این سری زمانی استخراج شده، با مدل‌های خانواده ARCH برازش داده شد و مقدار واریانس شرطی سری زمانی باقی‌مانده‌ها به دست آمد. سپس با استفاده از روابط مدل‌های ARCH، سری زمانی جدید باقی‌مانده‌ها محاسبه گردید و در نهایت با ترکیب دو مدل (3) AR و (1) ARCH، مدل تلفیقی AR-ARCH جهت پیش‌بینی و مدل‌سازی تراز سطح آب دریاچه ارومیه حاصل شد. نتایج دو آزمون

منابع مورد استفاده

- خلیلی ک، فاخری فرد ا، دین‌پژوهی، احمدی ف و بهمنش ج، ۱۳۹۱. معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش‌بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه شهرچای ارومیه). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد ۲۷. شماره ۲، صفحه‌های ۲۴۲ تا ۳۵۰.
- شقاقیان م و شقاقيان م، ۱۳۹۰. مقایسه مدل‌سازی زمانی (پیش‌بینی) تراز آب زیر زمینی با استفاده از منطق فازی و روش‌های پایه تحلیل سریهای زمانی (مطالعه موردی دشت شیراز). ششمین کنگره ملی مهندسی عمران. صفوی ح، ۱۳۸۸. هیدرولوژی مهندسی، انتشارات ارکان دانش، ۷۰۶ صفحه.
- قدم پور ز و شقاقيان م، ۱۳۹۰. مقایسه مدل‌های کلاسیک سری زمانی و هوش مصنوعی در تعیین سطح تراز آب زیرزمینی. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران.
- کارآموز م و عراقی نژاد ش، ۱۳۸۴. هیدرولوژی پیشرفته. چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران). ۴۶۴ صفحه.
- نظری تهروdi م و خلیلی ک، ۱۳۹۲. معرفی روش گشتاورهای پیشرفته SAM در برآورد دوره بازگشت حجم خشکی رودخانه (مطالعه موردی: حوضه‌های دریاچه ارومیه). اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب. تبریز، پاییز ۹۲.
- نظری تهروdi م، احمدی ف، خلیلی ک و ناظری تهروdi ز، ۱۳۹۲. کاربرد نرم افزار SAMS در مدل‌سازی اقلیم آینده کردستان جهت پیش‌بینی دما و بارندگی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنتنج). اولین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک.

- Andersen TG and Bollerslev T, 1998. ARCH and GARCH models. Pp. 1-11. In: Kotz S, Read CB and Banks DL (eds). Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. II. New York: John Wiley and Sons. DOI: 10. 1002/0471667196. ebs0592. pub2.
- Bera AK and Higgins ML, 1993. ARCH models: Properties, Estimation and Testing. *Journal of Economic Surveys* 7: 305-366.
- Bollerslev T, Engle RF and Nelson DB, 1994. ARCH models, Pp. 2959-3038. In: Engle RF and McFadden D (eds.), *Handbook of econometrics*, volume IV. Amsterdam: North-Holland.
- Bollerslev T, Chou RY and Kroner KF, 1992. ARCH modeling in finance. A selective review of the theory and empirical evidence. *Journal of Econometrics* 52: 5-59.
- Box GE and Jenkins GM. 1976. Time series analysis. *Forecasting and Control*, San Francisco: Holden-Day.
- Caiado J, 2007. Forecasting water consumption in Spain using univariate time series models. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 6610, posted 7. Online at <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6610/>
- Degiannakis S and Xekalaki E, 2004. Autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) models: A Review, *Quality Technology and Quantitative Management* 1: 271-324.
- Diebold FX and Lopez J, 1995. Modeling volatility dynamics. Pp. 427-472. In: Hoover K (ed.), *Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects*. Boston: Kluwer Academic Press.
- Engle RF, 1982. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflations. *Econometrica* 50: 987-1007.
- Engle RF, 1995. ARCH: selected readings. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Engle RF and Patton AJ, 2001. What good is a volatility model?, *Quantitative Finance* 1: 237-245.
- Kendall MG, 1938. A new measure of rank correlation, *Journal of Biometrika* 36: 81-93.
- Khalili K, Nazeri Tahrudi M, Abbaszadeh Afshar M and Nazeri Tahrudi Z, 2014. Modeling monthly mean air temperature using SAMS2007 (Case Study: Urmia synoptic station). *Journal of Middle East Applied Science and Technology* 15 (3): 578-583.
- Khatibi R, Ghorbani MA, Naghipour L, Jothiprakash V, Fathima TA and Fazelifard MH, 2014. Inter-comparison of time series models of lake levels predicted by several modeling strategies. *Journal of Hydrology* 511: 530–545
- Laux P, Vogl S, Qiu W, Knoche H. R and Kunstmann H, 2011. Copula-based statistical refinement of precipitation in RCM simulations over complex terrain. *Journal of Hydrology and Earth System Sciences* 15: 2401–2419.
- Mann HB, 1945. Nonparametric test against trend, *Journal of The Econometric Society* 13: 245-259.
- Mendenhall W and Reinmuth J, 1982. Statistics for Management and Economics. Fourth Edition. Duxbury Press. PWS Publishing Company
- Pagan A, 1996. The econometrics of financial markets. *Journal of Empirical Finance* 3: 15-102.
- Palm F, 1996. GARCH models of volatility. Pp. 209-240. In Rao CR and Maddala GS (eds.) *Handbook of Statistics*, Volume 14. Amsterdam: North-Holland.
- Salas JD, 1993. Analysis and modeling of hydrological time series. Pp 1-19. In: *Handbook of Hydrology*, edited by David R, Maidment, McGraw-Hill, New York.
- Shephard N, 1996. Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility models. Pp. 1-67. In Cox R, Hinkley DV and Barndorff-Nielsen OE (eds.) *Time Series Models in Econometrics, Finance and Other Fields*, London: Chapman & Hall.
- Steel RGD and Torrie JH, 1960. Principles and Procedures of Statistics. Pp 187-287, McGraw-Hill, New York.
- Thomas HA and Fiering MB, 1962. Mathematical Synthesis of Stream Flow Sequences for the Analysis of River Basin by Simulation. Harward university press, Cambrige, 751p.
- Tsonis AA, 2001. Probing the linearity and nonlinearity in the transitions of the atmospheric circulation. *Nonlinear Processes Geophysics* 8: 341-345.
- Wang W, Van Gelder PHAJM and Vrijling JK, 2005. Testing and modeling autoregressive conditional heteroskedasticity of stream flow processes. *Journal of Nonlinear Processes in Geophysics* 12: 55-66.
- Wilcoxon F, 1945. Individual comparison by ranking methods. *International Biometric Society* 1(6): 80–83.